

# EFFECTIVIDAD DEL PROPÓLEOS EN LA ENDODONCIA

Tania Parra Contreras

Ministerio de Salud Pública. Facultad de Ciencias Médicas. "MARIANA GRAJALES COELLO" HOLGUÍN. Cuba

## Abstract

Con la finalidad de contribuir a la aplicación de la propoleoterapia en las diferentes alteraciones pulporradiculares se realizó un estudio cuasiexperimental con muestra de 62 pacientes, los cuales asistieron a la consulta de Atención Primaria del Departamento de Estomatología en la Policlínica "Mario Gutierrez Ardaya" del Municipio Holguín en el periodo correspondiente del primero de Enero al treinta de Junio del año 1999 a los cuales se les había indicado tratamiento pulporradicular.

Los datos fueron recogidos en un formulario confeccionado al efecto, además de la Historia Clínica de Endodoncia evolucionando con intervalo de siete días. Se determinó la efectividad de la tintura de propóleos al 5% en los pacientes tratados, con resultados significativos a favor de los que curaron. Se valoró el tiempo promedio para concluir el tratamiento, el cual se logró entre los siete y catorce días de iniciado el mismo. No se detectaron cambios en la coloración del diente tratado, sólo se encontraron 5 pacientes con cambios en la coloración del diente antes de iniciar el tratamiento, aspecto que atribuimos a la alteración crónica que ocasionó la muerte pulpar. No se observaron cambios durante el tratamiento ni al finalizar el mismo. No se produjeron reacciones adversas.

Por los resultados obtenidos se recomienda el uso de la tintura de propóleos al 5% como cura Medicamentosa intraconducto en el tratamiento pulporradicular, así como continuar investigando la posibilidad de utilizarlo durante todo el tratamiento en diferentes formas farmacéuticas e intentar realizar la obturación definitiva con conos elaborados a partir de este apifármaco de magnificas propiedades.